

Singestar® Comprimidos

Terapia hormonal para Cães e Gatos

uso veterinário

FÓRMULA:

Cada comprimido de 280 mg contém:
Acetato de Megestrol 20 mg
Excipientes q.s.p. 280 mg

PROPRIEDADES:

O princípio ativo de SINGESTAR® COMPRIMIDOS é o acetato de megestrol, um poderoso progestágeno oral, amplamente experimentado em cães e gatos, com alta margem de segurança. O acetato de megestrol atua inibindo a secreção das gonadotrofinas hipofisárias e possui, além disso, acentuados efeitos anti-estrogênicos e anti-androgênicos. Estas propriedades fazem de SINGESTAR® COMPRIMIDOS um produto eficaz de múltiplas aplicações em Medicina Veterinária.

INDICAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:

SINGESTAR® COMPRIMIDOS deve ser administrado por via oral.

- **Falsa gravidez na cadela (Pseudociese):**
1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia durante 8 dias.
Com este tratamento desaparecem, em mais de 90% dos casos, as manifestações nervosas, o desenvolvimento mamário e a secreção láctea dentro dos primeiros 2 a 5 dias.
- **Hipersexualidade do cão:** A dose inicial deve ser de 1 ou 2 comprimidos, para cada 10kg de peso corpóreo/dia, durante 7 dias. Em seguida, 1/2 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo, durante 14 dias. Com este tratamento desaparecem em cerca de 80% dos casos, os problemas que se apresentam com maior frequência na hipersexualidade do cão: agressividade; delimitação de seu espaço com a urina; atitude de montar em pessoas e em outros cães; ficar vagando a esmo; intranquilidade; perda de peso, etc. Em alguns casos, deve-se administrar uma dose de manutenção de 1/2 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo, 1 ou 2 vezes por semana.
- **Adenoma das glândulas perianais:** 1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia durante 20 dias ou mais. Se for feita a extirpação cirúrgica é aconselhável prescrever uma dose de manutenção de 1/2 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo, 1 ou 2 vezes por semana, para evitar recaídas.
- **Hipertrofia próstata no cão:** 1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia, continuando a seguir com 1/2 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo, 2 vezes por semana.
- **Tumores estrógeno dependentes na cadela:** 1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia durante 5 dias, continuando a seguir com 1/2 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia, durante 10 dias ou mais.
- **Hipersexualidade do gato:** 1/2 comprimido/gato/dia durante 7 dias, continuando a seguir com 1/4 de comprimido/dia por animal, durante 14 dias. Os problemas mais comuns apresentados na hipersexualidade dos gatos (jatos de urina; excitabilidade; vagar a esmo; miados estridentes e contínuos) desaparecem em cerca de 80% dos casos. Pode-se também ser indicada uma dose de manutenção de 1/4 comprimido/gato, 1 ou 2 vezes por semana.
- **Dermatite miliar felina:** 1/2 comprimido diário por animal durante 7 dias até ser alcançada a regressão do quadro clínico. Deve-se continuar logo após com uma dose de 1/4 de comprimido por animal, 2 vezes por semana, até a cura total. É aconselhável prescrever uma dose de manutenção de 1/4 de comprimido/animal, a cada 15 dias, para evitar recaídas.
- **Granuloma eosinofílico dos gatos:** 1/2 comprimido por animal/dia, em média, até que a lesão comece a regredir, continuando a seguir com 1/2 comprimido por animal, 1 vez por semana até a regressão total.

CONTRAINDICAÇÕES, EFEITOS ADVERSOS E PRECAUÇÕES:

O acetato de megestrol, pertence ao grupo dos progestágenos, sendo o que menos efeitos colaterais produz. Sem dúvida, como todo progestágeno, é capaz de induzir tanto na cadela, como na gata, diversas alterações patológicas do útero (hiperplasia cística do endométrio, mucometra e/ou piometra).

O aparecimento destes sintomas, não depende unicamente da dose, mas também, da duração do tratamento e da sensibilidade própria de cada animal. Como regra geral, não é aconselhável sua administração em animais que tenham sofrido de problemas uterinos ou para animais impúberes. Os animais tratados continuamente com SINGESTAR® COMPRIMIDOS deverão ser submetidos periodicamente a uma revisão clínica, a fim de detectar o aparecimento de enfermidades uterinas.

Venda sob prescrição obrigatória e administração sob orientação do Médico Veterinário.

CONSERVAÇÃO: Conservar em local seco e fresco, a temperatura entre 4 a 35°C e ao abrigo da luz solar direta. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

APRESENTAÇÃO: Blister com 8 comprimidos de 280 mg cada, acondicionados em cartucho.

Licenciado no MAPA sob N° SP 000002-7.000011 em 26/7/93.

Responsável Técnico: M.V. Katia Miagava. CRMV-SP 22.699.



Proprietário e Fabricante: **Laboratórios König S.A.**
Uruguay 720 (B1868BAB) Avellaneda - Argentina.
Estab. Elab. N° 5580, SENASA Cert. N° 89.614.

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor: König do Brasil Ltda.,
Estrada Municipal, 889 - Rodovia Castelo Branco, km 68,5 - Bairro Dona Catarina - Caixa Postal 282
Mairinque – SP, CEP: 18120-000, CNPJ: 60.683.406/0001-48, Tel/Fax: (11) 4708-1867.
Atendimento ao consumidor: 0800 0156644 – 0800@konigbrasil.com.br

PRODUTO IMPORTADO